

核酸合成用試薬

L体RNAアミダイトと固相合成用支持担体

L-2'-TBDMS rA (n-bz)	500Å CPG	1000Å CPG	3'- CE Amidite
L-2'-TBDMS rC (n-acetyl)	500Å CPG	1000Å CPG	3'- CE Amidite
L-2'-TBDMS rC (n-bz)	500Å CPG	1000Å CPG	3'- CE Amidite
L-2'-TBDMS rG (n-ibu)	500Å CPG	1000Å CPG	3'- CE Amidite
L-2'-TBDMS T	500Å CPG	1000Å CPG	3'- CE Amidite
L-2'-TBDMS rU	500Å CPG	1000Å CPG	3'- CE Amidite

鏡像体のDNA (L-RNA)

L-核酸、シュピーゲルマー（「シュピーゲル」とは、ドイツ語で鏡を意味します）としても知られ、L-リボースまたはL-2'-デオキシリボースの糖の単位で構成される鏡像体のオリゴヌクレオチドです。この核酸のキラルな反転により、天然型のD-核酸に比べると、L-核酸は血漿中の核酸分解酵素に対する耐性が格段に向上されています。シュピーゲルマーは、*in vivo*での良好な結果が示されており、治療薬や診断薬としての可能性が期待されています。

L-核酸は、天然に存在するD-核酸の完全な鏡像体であり、L-核酸は溶解性、二本鎖の安定性、選択性の点で、D-DNAと同じ物理的、化学的な性質を持っています。ただし、左らせんの二重鎖を形成します。

ChemGenesでは、4種類の塩基のL体RNAアミダイトと固相支持担体を取り揃えています。これらのアミダイトは、Optical Rotationの検証を含む徹底した管理下で出荷いたします。

シュピーゲルマーを使った応用¹⁻⁷

L-核酸は、核酸医薬品や診断薬としての用途を含む。以下のような応用開発に用いられています。

- ・ アプタマー¹…高い核酸分解酵素耐性のシュピーゲルマーは、アプタマーとして有用です。
- ・ PCR²…配列が特定されているL-DNAタグとして利用して、PCR産物をコード化し特定するLT-PCRに利用できます。
- ・ マイクロアレイプローブ³…L-DNAをプローブに利用してマイクロアレイのプラットフォームに応用できます（図1）
- ・ エナンチオマー分離⁴…L-RNAアプタマーを用いた除草剤の分子のエナンチオマーの分離が報告されています。
- ・ モレキュラービーコン⁵…モレキュラービーコン（MB）のステムの部分にL-DNAを含むMBプローブを用いると、非特異的結合を防止することができます（図2）。
- ・ ナノテクノロジー⁶への応用
- ・ L-RNAは、細胞内において優れた安定性があります。特定の生体高分子へのL-RNAの長鎖のセレクションでは、ライブラリーの中から単離させます⁷。




図1： 鋳型DNAの配列特異的に結合するプライマーの伸長と標識。
PCRとマイクロアレイ³のためのプライマーが結合した
L-DNA (Zip コード) (イギリスのOxford Pressにより複製掲載許諾)







図2： モレキュラービーコン (MB)にL-DNA を用いると、非特異的な結合(a-c)を排除することができる。ユニバーサルなマイクロアレイのプラットフォーム⁵
(イギリスのOxford Pressのにより複製掲載許諾)

References:

- 1) Wlotzka, B et. al. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2002, 99, 8898–8902.
- 2) Hayashi, G et. al. ChemBioChem, 2007, 8, 169–171.
- 3) Hauser, N. C. et. al. Nucleic Acids Res., 2006, 34, 5101–5111.
- 4) Andre', C. et. al. Electrophoresis, 2006, 27, 3254–3262.
- 5) Kim, Y. et. al. Nucleic Acids Res 2007, 35, 7279–7287.
- 6) Lin, C. et. al. Nano Lett. 2009, 9, 433–436.
- 7) Klussmann S, et. al. Nat. Biotech. 1996, 14, 1112–1115.

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Beta-L-2'-tBDSilyl Adenosine (n-bz) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG- N- 4691-10	100 mg, 500 mg, 1 g pack 4 0.2µmol, 1.0µmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
	500Å CPG- N- 4691-05	pack 10 0.2µmol, 1.0µmol		
Beta-L-2'-tBDSilyl Adenosine (n-bz) 3'-CED phosphoramidite	ANP-4841	250 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g	FW 988.19 化学式 C ₅₃ H ₆₆ N ₇ O ₈ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
Beta-L-2'-tBDSilyl Cytidine (n-acetyl) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG- N- 4696-10	100 mg, 500 mg, 1 g pack 4 0.2µmol, 1.0µmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
	500Å CPG- N- 4696-05	pack 10 0.2µmol, 1.0µmol		

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Beta-L-2'-tBDSilyl Cytidine (n-acetyl) 3'-CED phosphoramidite	ANP-4846	250 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g	FW 902.10 化学式 C ₄₇ H ₆₄ N ₅ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Beta-L-2'-tBDSilyl Cytidine (n-bz) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-4692-10 500Å CPG-N-4692-05	100 mg, 500 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Beta-L-2'-tBDSilyl Cytidine (n-bz) 3'-CED phosphoramidite	ANP-4842	250 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g	FW 964.17 化学式 C ₅₂ H ₆₆ N ₅ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Beta-L-2'-tBDSilyl Guanosine (n-ibu) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-4693-10 500Å CPG-N-4693-05	100 mg, 500 mg, 1 g 1 col: 1.0 μmol pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Beta-L-2'-tBDSilyl Guanosine (n-ibu) 3'-CED phosphoramidite	ANP-4843	250 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g	FW 970.18 化学式 C ₅₀ H ₆₈ N ₇ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Beta-L-2'-tBDSilyl Thymidine 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-4695-10 500Å CPG-N-4695-05	100 mg, 500 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Beta-L-2'-tBDSilyl Thymidine 3'-CED phosphoramidite	ANP-4844	250 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g	FW 875.07	
			化学式 C ₄₆ H ₆₃ N ₄ O ₉ PSi	
Beta-L-2'-tBDSilyl Uridine 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 4694-10	100 mg, 500 mg, 1 g 1 col: 1.0 μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG-N- 4694-05	pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol		
Beta-L-2'-tBDSilyl Uridine 3'-CED phosphoramidite	ANP-4845	250 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g	FW 861.05	
			化学式 C ₄₅ H ₆₁ N ₄ O ₉ PSi	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。